

# Vybrané prostriedky na kontrolu slimákov (k 09.07.2024), Nemecko

Priятие					Obsah g/ kg	Účinná látka	Množstvo kg/ha	Zrná/m <sup>2</sup>	Frekvencia používania	Rozstupy v dňoch
Obilniny	Zemiaky	Kukurica	Repka olejná	Krmivo / cukrová repa						
X	X	X	X	X	30	Metaldehyd	6	40	2	7
X	X		X	(X)	30	Metaldehyd	7	53-55	3	14
X		X	X	X	30	Metaldehyd	3	32	2-3 <sup>3)</sup>	7-21
X			X		50	Metaldehyd	7	30	2	7
X	X	X	X	X	40	Metaldehyd	4-5 <sup>2)</sup>	30	5 <sup>1)</sup>	5
X		X	X	X	30	Metaldehyd	3	35	2-3 <sup>3)</sup>	7-21
X	X	X	X	X	25	Metaldehyd	5		5	5
					29,7	Železo-III-fosforečnan	7	55	4	0
X			X	X	24,2	Železo-III-fosforečnan	7	30-42	4	5
					29,7	Železo-III-fosforečnan	7	60	4	0

Pri všetkých aplikáciách sa musí dodržiavať minimálna vzdialenosť od vodných útvarov špecifická pre danú krajinu.

<sup>1)</sup> max. výdavky 17,5 kg/ha/rok; <sup>2)</sup> aplikačné dávky špecifické pre plodiny; <sup>3)</sup> frekvencie aplikácií špecifické pre kultúru

Návod na použitie a požiadavky nájdete v návode na použitie. Zdroj: LWK NRW